

## 1. i 2. miesiącu ciąży

Okolo terminu spodziewanej miesiączki możesz wykonać test ciążowy

## Badania w 3. miesiącu ciąży

Do 10. tygodnia ciąży powinnaś wykonać:

<ul style="list-style-type: none"><li>• Grupa krwi i Rh</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Przeciwciała odpornościowe do antygenów krwinek czerwonych</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Morfologia krwi</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Badanie ogólne moczu</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Badanie cytologiczne</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo, ewentualnie OGTT u kobiet z czynnikami ryzyka GDM</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Badanie VDRL</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zalecenie kontroli stomatologicznej</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Badanie HIV i HCV</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Badanie w kierunku różyczki (IgG, IgM)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Oznaczenie TSH</li></ul>

## **Badania w 4. miesiącu ciąży**

Między 11. a 14. tygodniem ciąży powinnaś wykonać:

- Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników (PTGiP).

Między 15. a 20. tygodniem ciąży powinnaś wykonać:

- Morfologia krwi
- Badanie ogólne moczu

## **Badania w 5. miesiącu ciąży**

Między 15. a 20. tygodniem ciąży powinnaś wykonać:

- Morfologia krwi
- Badanie ogólne moczu

Między 18. a 22. tygodniem ciąży powinnaś wykonać:

- Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami PTGiP

## **Badania w 6. miesiącu ciąży**

Między 21. a 26. tygodniem ciąży powinnaś wykonać:

<ul style="list-style-type: none"><li>• Badanie stężenia glukozy we krwi po doustnym podaniu 75 g glukozy (w 24–26 tygodniu ciąży)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Badanie ogólne moczu</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Przeciwciała anty-D u kobiet Rh (–)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze – badanie w kierunku toksoplazmozy (IgM)</li></ul>

## **Badania w 7. miesiącu ciąży**

Między 27. a 32. tygodniem ciąży powinnaś wykonać:

<ul style="list-style-type: none"><li>• Morfologia krwi</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Badanie ogólne moczu</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Przeciwciała anty-D u kobiet Rh (–)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Badanie ultrasonograficzne zgodnie z rekomendacjami PTGiP</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• W przypadku występowania wskazań – podanie immunoglobuliny anty-D (28–30 tydzień ciąży).</li></ul>

## **Badania w 8. miesiącu ciąży**

Między 33. a 37. tygodniem ciąży powinnaś wykonać:

<ul style="list-style-type: none"><li>• Morfologia krwi</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Badanie ogólne moczu</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Badanie antygenu HBs</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Badanie HIV</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Posiew z pochwy i odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących (35–37 tydzień ciąży)</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Badanie VDRL, HCV w grupie kobiet ze zwiększonym populacyjnym lub indywidualnym ryzykiem zakażenia</li></ul>

## **Badania w 9. miesiącu ciąży**

Między 38. a 39. tygodniem ciąży powinnaś wykonać:

<ul style="list-style-type: none"><li>• Badanie ogólne moczu</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Morfologia krwi</li></ul>

Po 40. tygodniu ciąży powinnaś wykonać

<ul style="list-style-type: none"><li>• Badanie KTG</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Badania USG</li></ul>