

Badania do 10. tygodnia ciąży

Grupa krwi i Rh
Przeciwciała odpornościowe
Morfologia krwi
Badanie ogólne moczu
Badanie cytologiczne
Badanie czystości pochwy
Badanie stężenia glukozy we krwi na czczo
VDRL (badanie w kierunku kiły)
Badanie stomatologiczne
Badanie HIV i HCV
Badanie w kierunku toksoplazmozy (IgG, IgM) i różyczki

Badania pomiędzy 21. a 26. tygodniem ciąży

Badanie stężenia glukozy we krwi po doustnym podaniu 75 g glukozy (w 24.–28. tygodniu ciąży) – dwukrotne oznaczenie stężenia glukozy: przed podaniem glukozy (na czczo) oraz po 2 godzinach od podania glukozy.
Badanie ultrasonograficzne
Badanie ogólne moczu
Przeciwciała anti-Rh u kobiet z Rh(–)
U kobiet z ujemnym wynikiem w I trymestrze – badanie w kierunku toksoplazmozy
Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.

Badania pomiędzy 27. a 36. tygodniem ciąży

Morfologia krwi
Badanie ogólne moczu
Przeciwciała odpornościowe
Badanie ultrasonograficzne
W przypadku występowania wskazań – podanie globuliny anti-D (28.–30. tydzień ciąży).
Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży.

Badania pomiędzy 33. a 37. tygodniem ciąży

Morfologia krwi
Badanie ogólne moczu
Badanie czystości pochwy
Antygen HBs
Badanie w kierunku HIV
Posiew z przedsionka pochwy i okolic odbytu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących
W grupie kobiet ze zwiększonym ryzykiem zakażenia: VDRL, HCV
Badanie cytologiczne, jeśli nie było wcześniej wykonane w okresie ciąży

Badania pomiędzy 38. a 39. tygodniem ciąży

Badanie ogólne moczu
Morfologia krwi

Badania po 40. tygodniu ciąży

Badanie KTG
Badanie ultrasonograficzne (jednorazowo)